

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الملخص العریضی

أجريت هذه الدراسة على ١٦٨٤ من ضروس العقل الدفينة في الفكین السفلی والعلوی ، التي أزيلت في قسمی جراحة الفم والوجه والفکین بمستشفى النور التخصصی ومستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة في الفترة من ١٩٩٠ الى ١٩٩٢ وكانت الاعمار تتراوح بين ١٥ - ٤٥ سنة . وقد وجهت عناية خاصة بالعمسر ، الجنس ، الزوايا والمضاعفات المصاحبة لضروس العقل الدفينة .

ومن نتائج هذا التحليل يتضح الآتیی :

- ١- ضروس العقل الدفينة تحدث في الفك السفلی أكثر منها في الفك العلوی .
- ٢- أعلى نسبة من ضروس العقل الدفينة لوحظت في مجموعة العمسر بين ٢٠ - ٤٠ سنة .
- ٣- لم يلاحظ فرق له قيمة بين علاقة الجنس وضروس العقل الدفينة في الفكین العلوی والسفلی .
- ٤- لوحظ فرق احصائی واضح بين الضروس الدفينة أفقياً والمائلة للخلف في الفكین .
- ٥- كانت أعلى نسبة في المضاعفات هي العهاب بالانسجة الرخوة حصول الضروس الدفينة والتسوس .